



KMT
The Heart of Healthcare

MEDISA ARA
GOSTAR P.J.S.C.



LIPOSOMAL CBD 3mg/ml

**ENHANCED
BIOAVAILABILITY**

C1



یک قطره آرامش، یک دنیا لبخند
برای تسکین درد و کاهش اضطراب



KMT
The Heart of Healthcare

MEDISA ARA
GOSTAR P.J.S.C.



LIPOSOMAL CBD 3 mg/ml

**ENHANCED
BIOAVAILABILITY**

C1



یک قطره آرامش، یک دنیا لبخند
برای تسکین درد و کاهش اضطراب



INOVO LIPOMED

سی بی دی چیست؟

کانابیس نام دیگر گیاه شاهدانه است که دارای خواص دارویی بسیاری است. از این گیاه، بیش از ۱۱۳ ماده شیمیایی با نام "کانابینوئید" به دست می‌آید که ازجمله اصلی‌ترین آن‌ها می‌توان به تتراهیدروکانابینول (THC) و کانابیدیول (CBD) اشاره کرد. کانابیدیول یا سی بی دی، یک فیتوکانابینوئید غیر روانگردان بسیار مشهور است که هیچ‌گونه اثر روانگردان مشابه تی‌اچ‌سی نداشته و بالعکس، دارای خواص درمانی بسیاری است که در سال‌های اخیر، پژوهش‌های بسیاری روی آن صورت گرفته‌است. برخی از این خواص عبارتند از:

- جلوگیری از مهاجرت سلول‌های سرطانی
- تحریک مرگ سلول‌های سرطانی
- جلوگیری از خون‌رسانی به تومور
- کاهش عوارض جانبی شیمی‌درمانی

- عملکرد ضد درد و ضد التهاب
- ضد اضطراب و ضد افسردگی
- ضد صرع
- ضد دیابت
- جلوگیری از رشد تومور

اینولپومد سی بی دی

اینولپومد سی‌بی‌دی حاوی طیف کامل عصاره کانابیس با مقدار زیاد کانابیدیول (سی‌بی‌دی) است که برای جذب و اثربخشی بالاتر با استفاده از تکنولوژی لیپوزومال فرموله شده است. مطالعات انجام شده در دپارتمان فارماکولوژی دانشگاه ناتینگهام، این فرآورده را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که میزان جذب و دسترسی زیستی این محصول ۲ برابر بیشتر از فرم‌های دیگر سی‌بی‌دی نظیر روغن و خمیر می‌باشد. علاوه بر این، جذب این فرآورده سریع‌تر بوده و مدت زمان بیشتری در خون باقی می‌ماند.

میزان و نحوه مصرف:

- بیش از مقدار توصیه شده استفاده نکنید.
- ۲ بار در روز و هر بار ۱ میلی‌لیتر از آن به تنهایی و یا به همراه یک لیوان آب مصرف شود.
- سی‌بی‌دی را با معده خالی و حداقل ۱۵ دقیقه قبل از صرف غذا مصرف کنید.
- برای جلوگیری از بی‌خوابی می‌توان دوز مصرفی عصر را زودتر و در هنگام بعد از ظهر مصرف کرد.

موارد منع مصرف:

- در صورت بارداری و شیردهی مصرف نکنید.
- در صورت مصرف هر گونه دارو حتماً با پزشک خود مشورت کنید.

عوارض جانبی:

CBD عوارض جانبی جدی ایجاد نمی‌کند و فقط به دلیل عملکرد افزایش هوشیاری، در برخی افراد ممکن است بی‌خوابی خفیف ایجاد کند.

-مصرف مداوم و طولانی مدت آن (بیش از شش ماه) ممکن است موجب کاهش تعداد گلبول‌های سفید خون شده و احتمال بروز عفونت را افزایش دهد.
-در برخی افراد نیز ممکن است موجب بی‌خوابی شود.